



مسئولیت متن و شکل بدوش نویسنده مضمون میباشد، عقیده نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنلاين نمی باشد



۲۰۲۶/۰۴/۳۰

ډاکټر ش میره کی

د لاسونو او پښو د بندونو یا مفصلو دردونه

گرانو دوستانو! هغه مثل ده څه وايي روغ ځان هم نیمه پاچاهي ده نو په دې توگه مو خپل روغتیا ته هم پام کوي

د لاسونو او پښو د بندونو یا د مفصلو دردونه

زموږ په هیواد کې ډیری هغه کسان چې عمر وروسته یې له ۵۰ کلونو لور وی پدې ناروغۍ اخته کیږي دا دردونه گڼ شمیر لاملونه لري چې تر ټولو اړین لامل یې د هډوکو تخریبي ناروغۍ یا اوسټیو ارترايټیس ده چې د نارینو په پرتله ښځې ډیرې پرې اخته کیږي او عموماً هغه بندونه چې زیات وزن تحمل کوي لکه د وړانې او ځنگون بند زیانمنوي ، دا ناروغي دوه ډولونه لري !

۱: ابتدایي ډول چې لامل یې څرگند نه ده

۲: ثا نوي ډول : چې د نورو لاملونو له کبله لکه په مفصل باندې ضربه ، د بندونو مکروبي یا گزک کیدل ، کم وپني (کمخوني) د شکرې ناروغي ، د محیطي ا عصابو ناروغي ، د کورتیکو استروید درملو ډیره کارونه ، روماتیزم ، نقرص ، د بندونو بیخایه کیدل ، په بندونو باندې په دوامدار ډول د ډیر وزن راتگ ، چاغوالی ، د وپني سرطان او داسې نور ډیر لاملونه لري .

پتوجینیسز یا د ناروغۍ د حالت څیرنه :

پدې ناروغۍ کې په ځانگړی ډول د بندونو کرپندوکي (غضروف) په رنځ اخته او تخریب کیږي چې یو ډول انزایمونه د کرپندوکو له حجراتو څخه ازادیږي چې د کولاجن الیاف یا سپینسی ماتوی او د بندونو په کرپندوکو کې درزونه پیدا کوي او پدې توگه بندونه پرسوب کوي او له هډوکو جدا کیږي چې په پایله کې د هډوکو مفصلي سطحه لوڅیږي او د حرکت په وخت کې هډوکي یو په بل سولیري درد او کرپاری پیدا کوي .

ددې ناروغۍ نښې او نښانې

لکه مخکې چې وویل شول کوچني بندونه یا د گوتو واړه بندونه لږ پرې اخته کیږي چې عموماً د گوتو لومړی او دویم بند به پرسیدلی او ډیر دردمن وي د درد ناڅاپي حملې یې ښه وصفي نښه ده خو ددې ناروغۍ په پرمختللو حالاتو کې د گوتو کوروالي یا سټو شکل لیدل کیدای شي څنگه چې لوی بندونه ډیر پرې اخته کیږي نو په نوموړو بندونو کې به لاندې نښې نښانې ولیدل شي .

درد :

درد به په ځانگړی ډول د زنگون او وړانې په بند کې د سهار مهال ډیر شدید وي له گرځیدو سره به نوره هم ډیريږي له استراحت سره به کمیږي لومړی به وقفوي وصف ولري خو وروسته به مزمن شکل غوره کړي .

د بندونو سهارنی شخوالي :

د سهار لخوا د ناروغانو ته له بستره پاڅیدل ډیر ستونزمن وي او نیږدې تر نیم ساعته د بندونو دا شخوالي دوام کوي او وروسته ورو ورو کمیږي .

د پاڼو شمیره: له 1 تر 3

افغان جرمن آنلاين په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له مور سره اړیکه ټینګه کړئ maqalat@afghan-german.de

یادونه: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په خیر و لولئ

د اخته بند د حرکاتو کمیدل :

پدې ناروغی کې مفصل نا توانه کیږي او حرکات یې کمیږي چې عمده علت یې درد او شخوالي ده .

د بندونو پړسوب :

په اخته بندونو کې به هډوکي پرسیدلي ولیدل شي او کله کله پرسیدلي مفصل له اوبو ډک وي .

کړپاري :

د حرکت پواسطه په مفصل کې کړپاري اوریدل کیدای شي په ځانگړی ډول د لمانځه د ادا په مهال او د زنگنو په قاطیدلو کې .

د عضلاتو کمیدنه :

د مفصل شا وخوا عضلات کمیږي او د بند هډوکینه برخه لویه بڼکاري .

سټو شکل یا تغیر د شکل :

په ځانگړی ډول د زنگون مفصل ډیر وخت د باندې او یا دننه خواته کوروالی پیداکوي او یا قاتیږي چې ناروغ بیا نشی کولای هسکه غاړه وگرځی نو ځکه دا ناروغان په ټیټه ملا او یا په عامه اصطلاح په نیم قامته گرځي .

ددې ناروغی تشخیص :

د ډاکټرانو لخوا ددې ناروغی پیژندنه ډیره ستونزمنه نه ده کولای شی چې د ایکس رې او کلینیکي نښو نښانو په شتون کې دا ناروغی وپېژني ، چې په ایکس رې کې د بندونو ترمنځ د نورمال حالت په پرتله زیاته خلا یا لیري والي لیدل کیږي او په ځینو ناروغانو کې به د هډوکو په غاړه کې کوچنی هډوکي پرسویونه ، سیستونه او یا اوبه ولیدل شي خو لابراتواري تستونه کوم ځانگړي تشخیصي ارزښت نلری .

د ناروغی تفریقي تشخیص :

دا ناروغی ډیری وخت له ریوماتوید ارتراپیتیس سره مغالطه کیږي او باید ډاکټران یې د ښه تشخیص په موخه په پام کې ونیسي . په ریوماتوید ارتراپیتیس کې معمولاً د گوتو واره بندونه درد کوي ، د اخته بندونو شمیر به زیات وي او د وینې په معاینه کې به ای ایس آر لور او آر ایچ فکتور به مثبت وي خو په اوسټیو ارتراپیتیس کې به د وینې معاینه نورمال وي .

درملنه :

ددې ناروغی درملنه ډاکټر او ناروغ دواړه ځوروي او تغیرات یې لکه د کرپندوکو تخریب او کوروالی په درملو نه تداوی کیږی خو د درد د آرامولو او د سټوشکلونو څخه د مخنیوي لپاره درمل گټور دي او عموماً غیر استروید د درد ضد درمل لکه دیکلو فینک ، پایروکسیکیم ، اسپرین ، بروفین او داسې نور د ډاکټر په مشوره په یوه واری مقدار کارول کیدای شي ، همدارنګه د مفصل دننه د کورټیکو استروید لکه کینا کارت امپول یعنی پیچکاری تر یوه وخته د درد د لمنځه تلو سبب کیدای شي ، ولی په مفصل کې د کورټیکو استروید امپول یواځې له ۵۰ تر ۶۵٪ ناروغانو کې ښه نتیجه ورکولای شي او پاتې نور بیا هم له درده ځورویږي خو که په مفصل کې اوبه شتون ولري باید اوبه یې وویستل شي .

ددې لپاره چې د مفصلي سطحو د ډیر تخریب څخه مو مخنیوی کړی وي باید دې ناروغانو ته گلوکوزامین+کانډروټین چی د کپسولو په بڼه په مختلفو نومونو په بازار کې پیدا کیږي په درملنه کې ورزیات شي .

ددې ناروغی ښه درملنه د جراحي له لپاره د مفصل اویا مفصلي سطحو بدلول دي چې د ناروغه مفصل په ځای مصنوعي مفصلونه کارول کیږي خو د لگښت د ډیروالی له کبله ډیر ناروغان دې ډول درملني ته لاسرسی نشی درلودی .

ځینی فزیکي محدودونه لکه تمرینات ، گرم تطبیقات او یا ټکورول او د زیتونو په تیلو غورول یې هم د درد د کموالي او هم د عضلاتو د حرکاتو په ډیروالی او د سټوشکلونو څخه په مخنیوی کې مرسته کولای شي .

د پانې شمیره: له 2 تر 3

افغان جرمن آنلاین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له مور سره اړیکه ټینګه کړئ maqalat@afghan-german.de

یادونه: دلیکني د لیکنيزې بنې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هيله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په څیر و لولی

هغه کسان چې پدې ناروغۍ اخته وي باید لاندې ټکي په پام کې ونیسئ!

۱: د وزن کمول

۲: استراحت کول او په بندونو د ډیر وزن څخه مخنیوی

۳: وړ او مناسب پلي تگ

۴: د هغو دندو پرینسودل چې په مفصل باندې د ډیر وزن د راتگ او یا د فشار سبب کېږي.

۵: د خپلسرو او غیرې مسلکي کسانو پواسطه له درملنې څخه باید لاس واخیستل شي او د درد د پیدا کېدو په صورت کې ژر تر ژره باید د اورتوپېډي ډاکټر سره مشوره وشي .

Osteoarthritis
(late stage)

Fusiform
swelling
of joints

Heberden's nodes

Dr SH Mirakai

ADAM

NORMAL

OSTEOARTHRITIS



Dr SH Mirakai

د پاڼو شمېره: له 3 تر 3

افغان جرمن آنلاین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي. په دغه پته له مور سره اړیکه ټینګه کړئ maqalat@afghan-german.de

یادونه: دلیکني د لیکنيزې بنې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هيله من یو خپله لیکنه له رالیولو مخکې په څیر و لولئ